

KRÓTKIE DONIESIENIA

31. Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków ważek (*Odonata*) w Polsce

New localities of some rare species of dragonflies (*Odonata*) in Poland

Sympecma braueri BIANCHI (= *S. paedisca* (BRAUER))

Gatunek znany w Polsce z bardzo nielicznych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku.

Nowe stanowiska:

- Kosinek (UTM-WU66), 2,7 km na W-NW od Drawin (woj. gorzowskie), 15 IX 1988 1♂, 1♀; łąki z siecią częściowo stagnujących rowów (wzdłuż ich obrzeży łąki niskotorfowiskowe) i odległym o kilkaset metrów torfowiskiem niskim z turzycami (*Carex* sp.) i pałąką szerokolistną (*Typha latifolia* L.),
- Słonów (WU56), nad jez. Słonowo, 3,7 km na S-SE od Dobiegniewa (woj. gorzowskie), 12 V 1990 1 ♀; niskotorfowiskowe łąki nadjeziorne z siecią rowów.

Erythromma viridulum (CHARPENTIER)

W Polsce znana z nielicznych stanowisk, jedynie w Wielkopolsce częstsza (uważa się, że przebiega tu północna granica zasięgu gatunku). Nowe stanowisko:

- przy osadzie Kosinek (WU66), 3,5 km na W-NW od Drawin (woj. gorzowskie), 7 VIII 1991 1♂ (obserwowano dość liczne osobniki, także in copula), śródleśne zabagnione oczko z kłocią wiechowatą (*Cladium mariscus* (L.) POHL., i grzybieniem białym (*Nymphaea alba* L.); gatunek nowy dla Pomorza Zach. (południowe krańce)

Aeshna affinis (VAN DER LINDEN)

Gatunek wykazany z niewielu stanowisk, prawie wyłącznie na południu Polski. Przez Wielkopolskę przebiega północna granica zasięgu (dotąd stwierdzono w tym regionie dwukrotnie po 1 ♂).

Nowe stanowisko:

- kilkaset metrów na S od jez. Lusowskiego (XU11), 1,6 km na E od Lusówka (woj. poznańskie), 4 VIII 1990 1 ♂; oprócz odłowionego samca obserwowano też ♀ tego gatunku (przez chwilę z ♂ in copula); stagnujący rów na śródleśnej silnie nasłonecznionej polanie; stanowisko to jest drugim z kolei najdalej na północ wysuniętym miejscem występowania *A. affinis* w Polsce.

Aeshna subarctica (WALKER)

W Polsce pewne stanowiska znane są z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierzy Pomorskiego i Mazurskiego, Sudetów i Tatr. Nowe stanowiska:

- 1,25 km na E od wsi Gać (XA66), Słowiński PN, 7 IX 1989 1 ♂; torfowisko wysokie z oczkiem
- Zielona Chocina (XV 57), woj. śląskie, 8 IX 1989 1♂; jezioro dystroficzne z torfowiskiem przejściowym kilkaset m na N od wsi

Wszystkie okazy zostały złowione przeze mnie i znajdują się w moich zbiorach.

RAFAŁ BERNARD, Poznań