

### 231. Ciekawe gatunki motyli (*Lepidoptera*) z Obniżenia Ścinawskiego (Dolina Odry)

Interesting butterflies (*Lepidoptera*) of the Obniżenie Ścinawskie (Odra Valley)

KEY WORDS: *Lepidoptera*, new records, Odra Valley, Poland.

Podczas badań prowadzonych w latach 1996 – 1998 w Dolinie Środkowej Odry stwierdzono występowanie szeregu interesujących gatunków motyli, z których kilka zasługuje na oddzielne odnotowanie.

*Anticlea derivata* (DEN. et SCHIFF.) (*Geometridae*)

– Tarchalice (UTM: XS09), 1 ex., 3 V 1997, M. LISIECKA (obecnie MARZEC) leg.

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w środkowej i południowej Polsce, głównie z pogórza i gór. Dotychczas nie wykazywany z Doliny Środkowej Odry.

*Hyphoraia aulica* (L.) (*Arctiidae*)

– Wodnica (XS09), 1 ex., 1 V 1997, dorosła wędrująca gąsienica, M. LISIECKA (obecnie MARZEC) leg.

Gatunek obecnie bardzo rzadko notowany, dawniej lokalny w całym kraju. Ostatnia informacja o jego występowaniu na pobliskich Wzgórzach Trzebnickich pochodzi z 1855 roku.

*Boloria dia* (L.) (*Nymphalidae*)

– Śleszów (XT01), 1 ex., 20 VII 1996, A. MALKIEWICZ leg.

Gatunek w ostatnich dziesięcioleciach nie wykazywany z części nizinnej Dolnego Śląska, mimo występowania wielu populacji w pozostałych regionach Polski.

*Erebia medusa* (DEN. et SCHIFF.) (*Satyridae*)

– Dębno (XS08), 1 ex., 29 V 1997, A. MALKIEWICZ leg.

– Śleszów (XT01), liczny, 14 VI 1997, 30 V 1998, A. MALKIEWICZ leg.

W Polsce poza górami i pogórzem gdzie jest liczny, występuje lokalnie na nizinach. Powyższe stanowiska są nowymi na granicy zasięgu tego gatunku.

Adam MALKIEWICZ, Wrocław  
Magdalena MARZEC, Wrocław

### 232. *Eucarta virgo* (TREIT.) (*Lepidoptera: Noctuidae*) na Ziemi Chełmińskiej (północno-wschodnia Polska)

*Eucarta virgo* (TREIT.) (*Lepidoptera: Noctuidae*) in Ziemia Chełmińska (NE Poland)

KEY WORDS: *Lepidoptera, Noctuidae, Eucarta virgo*, record, NE Poland.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych nad motylami okolic Wąbrzeźna na Ziemi Chełmińskiej stwierdzone zostało występowanie tam *Eucarta virgo* (TREIT.).

– ad Wąbrzeźno (UTM: CE60), 11 IX 1998, 1 ♀, leg. Sz. KRAWCZYK.

Jest to najdalej na północ wysunięte, znane stanowisko tego motyla w Polsce. Do niedawna omawiany gatunek znany był w naszym kraju tylko z Bieszczadów. W ostatnich latach obserwuje się jego ekspansję w kierunku północnym i zachodnim, gdyż znaleziony był w okolicach Dwikoz (Wyżyna Małopolska) oraz koło Kępna w Wielkopolsce.

Szymon KRAWCZYK, Wąbrzeźno